实验技术与方法

虫草胶囊菌粉的鉴定与分析

刘光全 陶水华 李辉 程池

(中国食品发酵工业研究院中国工业微生物菌种保藏管理中心,北京 100027)

摘要:目的 探讨建立一种虫草胶囊菌粉真伪的检测方法。方法 以95%乙醇、乙酸乙酯和 Tris-HCl 对胶囊菌粉产品处理后再提取DNA,排除虫草胶囊菌粉中杂质对PCR扩增的干扰,采用PCR扩增该菌粉 ITS1-5.8S-ITS2 区的序列。结果 鉴定分析了3个不同厂家虫草胶囊产品的发酵菌粉,系统发育学分析表明样品1胶囊生产菌为中国被毛孢(*Hirsutella sinensis*),属于国家卫生部允许的可用于保健食品的真菌菌株;样品2和样品3分别为西藏虫草(*Cordyceps gracilis*)和蛹虫草(*Cordyceps militaris*),均与产品名称“冬虫夏草”(*Cordyceps sinensis*)不符,且不属于国家卫生部允许的保健食品菌株。结论 该方法简单易行,可以有效的鉴定市售虫草相关产品的真伪,为该类产品的真伪鉴定开拓了新的思路。

关键词:冬虫夏草;中药鉴定;发酵;聚合酶链反应

Identification and Analysis of *Cordyceps* Products

LIU Guang-quan, TAO Shui-hua, LI Hui, CHENG Chi

(China National Research Institute of Food and Fermentation Industries Chinese Center of Industrial Culture Collection, Beijing 100027, China)

Abstract: Objective To develop a method for true-false distinguish of *Cordyceps* capsule products. **Method** Before extracting the genomic DNA, three samples were pretreated by 95% alcohol, ethylacetate and Tris-HCl for removing impurities in the capsules, and then the ITS1-5.8S-ITS2 region sequence was amplified from the genomic DNA. **Results** Three *Cordyceps* capsule products sold in the market were identified by phylogenetic analysis. The phylogenetic analysis results showed that sample 1 belonged to *Hirsutella sinensis*, which was permitted for *Cordyceps* capsule manufacture by the Ministry of Health, P. R. China. while “sample 2” and “sample 3” were *Cordyceps gracilis* and *Cordyceps militaris*. **Conclusion** The method could be simple, credible. It is a new idea for true-false distinguish of *Cordyceps* capsule products.

Key words: *Cordyceps sinensis*; TCD Identification; Fermentation; Polymerase Chain Reaction

冬虫夏草(*Cordyceps sinensis* (Berk) Sacc.)是我国名贵的滋补中药和保健食品。由于受到生长条件的限制,天然冬虫夏草产量有限,且呈逐渐下降的趋势^[1]。20世纪80年代起,一些单位将其分离到的冬虫夏草无性型菌株进行深层发酵,并将发酵菌丝或发酵物制成不同产品,投放到医疗和保健品市场^[2]。卫生部允许在保健食品生产中应用的虫草类真菌只有蝙蝠蛾拟青霉(*Paecilomyces hepiali*)和中国被毛孢^[3,4](*H. sinensis*)两种,在利益驱动下,市场中常有伪品、混淆品和代用品出现。所以对虫草产品真伪的鉴别具有很高的应用价值。

rDNA 序列测定分析法已经广泛运用于真菌菌种的鉴定^[4,5]。本实验以市售3个不同厂家胶囊菌粉为研究对象,对其菌粉处理后提取基因组DNA来

扩增 ITS1-5.8S-ITS2 区特征序列,并对该产品基因序列与相关虫草属内种做了系统发育分析,阐述了这3种以“冬虫夏草”为名上市的产品与冬虫夏草无性型菌之间的关系。

1 材料与方法

1.1 材料

胶囊产品样品1、2、3均购自北京某药店。

CTAB,购自Sigma公司;琼脂糖、Goldview、1xTAE电泳缓冲液、10×PCR缓冲液、dNTP、Taq DNA聚合酶,购自天根生化试剂公司;EDTA、氯化钠、Tris 饱和酚、氯仿、异戊醇:国产分析纯。

1.2 方法

1.2.1 基因组DNA的提取 CTAB法^[6]加以改进。

(1) 将适量虫草胶囊菌粉加1000 ml 95%的乙醇溶于烧杯中浸泡1h,纱布过滤,将所得滤液离心,丢弃上清,得到菌粉,重复该步骤2次。

(2) 将第一步得到的菌粉用乙酸乙酯浸泡10~

基金项目:国家科技基础条件平台建设项目(2005DKA21204)

作者简介:刘光全 男 助理工程师

通讯作者:程池 男 教授级高工

15 min,离心后弃上清,所得沉淀用 Tris - HCl 浸泡 10 ~ 15 min,13 000 r/min离心 2 min 弃上清。

(3) 加 500 ml 95 % 的乙醇浸泡 10 ~ 15 min,13 000 r/min离心 2 min 弃上清。

(4) 加 500 ml 无菌水清洗 2 次,13 000 r/min离心 2 min 弃上清。

(5) 所得菌粉加石英砂充分研磨,加入 2 × CTAB 和 10 % SDS 溶液,于 65 °C 水浴 1 h,离心吸取上清,再加入 2 × CTAB 和 10 % SDS,重复第五步骤 1 次。

(6) 取出离心管,待其冷却后加入等体积的酚/氯仿:异戊醇,振荡混匀 13 000 r/min离心 10 min,重复抽提 3 次。

(7) 吸取上清加入 0.8 倍体积的异丙醇混匀,放置 4 ~ 30 min。

(8) 13 000 r/min离心 10 min。

(9) 将 DNA 沉淀用 70 % 的乙醇清洗 3 次,干燥后加 100 μl TE(pH 8.0) 溶解, - 20 °C 保存 DNA。

1.2.2 引物 本实验采用下列引物进行 PCR 扩增,引物序列如下:

引物 ITS4(5' - TCC CCG CTT ATT GAT ATG C - 3')

引物 ITS5(5' - GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G - 3')^[7]

1.2.3 TD - PCR 扩增^[8]

TD - PCR 反应条件:95 °C 5 min;95 °C 1 min,55 °C 1 min,每个循环 - 0.5 min,72 °C 1 min,20 个循环;72 °C 5 min;94 °C 1 min,45 °C 1 min,72 °C 1 min,15 个循环;72 °C 5 min。4 °C 保存,结束。

注:图 1 中 1 为 Hand / DNA,2、3、4 分别为样品 1、2、3,图 2 中 1 为 100 bp Marker,2、3、4、5 分别为样品 1、2、3 和超纯水

图 1 胶囊菌粉总 DNA 电泳用图片

反应体系为 100.0 μl: Taq 酶 (5 U/μl) 0.8 μl; 10 × PCR 缓冲液 (Mg²⁺ Plus) 10 μl; dNTP 混合液 (各 2.5 mmol/L) 8 μl; 模板 DNA (基因组 DNA) 2.5 ng; 引物 ITS4 (10 μmol/L) 2 μl; 引物 ITS5 (10 μmol/L) 2 μl; 超纯水补足到 100 μl。

反应结束后,取 4 μl 扩增产物经 1.0 % 琼脂电泳,用 Goldview 染色后紫外检测(同时设置不含模板 DNA 的阴性对照)。

1.2.4 PCR 产物测序 纯化后的 PCR 产物以 ITS4 和 ITS5 为测序引物进行测序,由上海基康生物技术有限公司完成。

1.2.5 系统发育树的构建^[9] 采用序列图谱软件 Chromas,参照正、反向序列图谱,对序列人工校对。从 GenBank 核酸序列数据库中下载虫草属相关菌株的 ITS1 - 5.8S - ITS2 序列,与所测目的序列放在一起,用 Clustal X 软件进行序列比对 (alignment); 然后利用 MEGA3.1 生物学软件的 Neighbor-Joining 连接法构建系统发育树,并进行 1 000 次 Bootstrap 检验。

2 结果与分析

2.1 基因组 DNA 提取和 PCR 扩增

为了使菌粉软化和有机杂质溶于液相,对胶囊菌粉先用 95 % 乙醇浸泡 1 h,然后用乙酸乙酯和 Tris - HCl 对有机质干扰成分进行萃取,再用 CTAB 法进行 DNA 提取,可以得到白色絮状 DNA。经琼脂糖凝胶电泳分析和紫外检测,提取的 DNA 大小约为 23 kb 左右(见图 1)。PCR 扩增片段条带特异性强,大小约为 550 bp,阴性对照无任何条带(图 2)。

2.2 序列测定与系统发育树的构建

图 2 胶囊菌粉 PCR 扩增 ITS1 - 5.8S - ITS2 区图片

以 ITS4 和 ITS5 为引物对 PCR 产物进行测序,得到 552 bp。将 3 个序列分别与 GenBank 库中相关

菌株序列进行同源性比较分析,发现“样品 1”与 *H. sinensis* (AB 067721 和 AB 167308) 同源性高达

99.6% ,而与虫草属其他菌株的同源性在 90% 以下 (图 3)。样品 2 与西藏虫草 (*C. gracilis*) 同源性 97.5% ,样品 3 与蛹虫草 (*C. militaris*) 同源性 99.8% ,样品 2 和样品 3 与 *H. sinensis* 相似性小于 80.0% 。以香菇菌 (*Lentinus edodes*) 为外群构建的 ITS1 - 5.8S - ITS2 区序列的系统发育树直观的显示

了 3 个虫草菌粉序列与虫草属内各个种之间的系统发育关系 (图 3、图 4) ,表明样品 1 胶囊生产菌株为中国被毛孢 (*H. sinensis*) ;而样品 2 和样品 3 鉴定结果分别为西藏虫草和蛹虫草,其不在中华人民共和国卫生部 (卫法监发[2001]84 号文) 批准列入“可用于保健食品的真菌菌种名单”之列。

注:标尺参数表示进化距离,分枝上的数据表示 Bootstrap 检验的支持百分率;

图中 T. C. H. L. 分别表示: *Tolypocladium*; *Cordyceps*; *Hirsutella*; *Lentinula*。

图 3 依据 ITS1 - 5.8S - ITS2 区序列构建样品 1 胶囊生产菌与相关种属的系统发育树

注:标尺参数表示进化距离,分枝上的数据表示 Bootstrap 检验的支持百分率;

图中 T. C. H. L. 分别表示: *Tolypocladium*; *Cordyceps*; *Hirsutella*; *Lentinula*。

图 4 依据 ITS1 - 5.8S - ITS2 区序列构建样品 2 和样品 3 胶囊生产菌与相关种属的系统发育树

3 讨论

蝙蝠蛾被毛孢 (*H. hepiali*) 与中国被毛孢 (*H. sinensis*) 为同物异名, 且为冬虫夏草无性型菌株^[10-13]; 该菌是目前国内唯一得到学术界公认且可通过“生物还原法”验证的冬虫夏草有效菌^[14-16]。同时经中华人民共和国卫生部(卫法监发[2001]84号文)批准列入“可用于保健食品的真菌菌种名单”。

虫草胶囊以发酵菌粉为主要原料, 加入黄精、明胶、甘油、增塑剂、防腐剂、遮光剂、色素和其他适宜的中药材精制而成。这些成分对基因组 DNA 的提取及 PCR 扩增有很大影响。采用常规的 CTAB 法对胶囊菌粉进行 DNA 提取, 所得 DNA 样品呈现深黄色油状, 不利于下一步的 PCR 扩增。为了排除其他成分的干扰, 本实验对 CTAB 法加以改进, 先对胶囊菌粉用 95% 乙醇浸泡, 再用乙酸乙酯和 Tris-HCl 对其进行萃取, 最后用 CTAB 法提取 DNA, 所得 DNA 可以有效的进行 PCR 扩增。

本实验对市售的胶囊菌粉进行了系统发育学分析。结果表明, 样品 1 胶囊生产菌与中国被毛孢 (*H. sinensis*) 位于同一分支, 同源性为 99.6%, 证明了该产品的生产菌株为真正的冬虫夏草无性型菌株; 而样品 2 和样品 3 分别为西藏虫草 (*C. gracilis*) 和蛹虫草 (*C. militaris*), 均与产品名称“冬虫夏草” (*C. sinensis*) 不符。本研究所用方法简单易行, 可以有效的鉴定市售虫草相关产品的真伪, 为该类产品的真伪鉴定开拓了新的思路。

参考文献

[1] 蒋毅, 姚一建. 冬虫夏草无性型研究概况[J]. 菌物系统, 2003, 22(1): 161-176.

- [2] 徐锦堂. 中国药用真菌学[M]. 北京: 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1997: 357.
- [3] 李增智, 黄勃, 李春如, 等. 确证冬虫夏草无性型的分子生物学证据——中国被毛孢与冬虫夏草之间的关系[J]. 菌物系统, 2000, 19(1): 60-64.
- [4] 赵锦, 王宁, 陈月琴, 等. 冬虫夏草无性型的分子鉴别[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1999, 38(1): 121-123.
- [5] 章卫民, 李泰辉, 陈月琴, 等. 西藏冬虫夏草无性型的分子生物学研究[J]. 微生物学通报, 2002, 29(3): 54-57.
- [6] 易润华, 朱西儒, 周而勋. 简化 CTAB 法快速微量提取丝状真菌 DNA[J]. 湛江海洋大学学报, 2003, 23(6): 72-73.
- [7] MICHAEL A I, DAVID H G, JOHN J S, et al. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications[M]. New York: Academic Press, 1990: 1-482.
- [8] 迪芬巴赫 W, 德维克斯勒 G S. PCR 技术试验指南[M]. 北京: 科学出版社, 2003: 34-36.
- [9] 蒋彦, 王小行, 曹毅, 等. 基础生物信息学及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003: 64-74.
- [10] 刘作易. 虫草属及其无性型关系研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 1999: 1-180.
- [11] LIU Z Y, YAO Y J, LIANG Z Q, et al. Molecular evidence for the anamorph/teleomorph connection in *Cordyceps sinensis* [J]. Mycological Research, 2001, 105: 827-832.
- [12] LIU Z Y, YAO Y J, LIANG Z Q, et al. Molecular evidence for the anamorph/teleomorph connection in *Cordyceps sinensis* [J]. Mycological Research, 2001, 105: 827-832.
- [13] JIANG Y, YAO Y J. Names related to *Cordyceps sinensis* anamorph [J]. Mycotaxon, 2002, 84: 245-253.
- [14] 莫明和, 迟胜起, 张克勤. 冬虫夏草的微循环产孢及其无性型的分离[J]. 菌物系统, 2001, 20: 482-485.
- [15] 尹定华, 李黎, 黄天福, 等. 贡嘎蝙蝠蛾各虫态生态学的研究[J]. 特产研究, 1994, (4): 5-7.
- [16] 李泉森, 曾纬, 尹定华, 等. 冬虫夏草菌世代交替的初步研究[J]. 中国中药杂志, 1998, 23: 210-212.

[收稿日期: 2009-03-08]

中图分类号: R15; R282.710.3

文献标识码: B

文章编号: 1004-8456(2009)05-0418-04

L - 阿拉伯糖的作用

L-阿拉伯糖属于五碳糖, 无热量。近年来国际、国内的生理学家和营养学家就 L-阿拉伯糖在肠道内对糖类代谢的作用做了一系列深入研究, 发现 L-阿拉伯糖对传统糖类的吸收有竞争抑制作用, 对传统糖类的代谢转化具有显著阻断作用, 使得它在减肥、控制糖尿病等方面的应用前景看好。据研究, 只要在普通蔗糖中添加 2% 的 L-阿拉伯糖, 就可以抑制 40% 蔗糖的吸收, 同时也抑制了血糖的升高。

L-阿拉伯糖最显著的作用是抑制人体小肠内蔗糖酶的活性, 从而调节人体对蔗糖的过量吸收, 从根本上起到控制血糖、降低血脂和减少脂肪堆积的功效。

日本厚生省的特定保健用食品清单中将 L-阿拉伯糖列入调节血糖的特定保健食品, 美国医疗协会也将 L-阿拉伯糖列入抗肥胖剂的营养补充剂或非处方药。L-阿拉伯糖作为一种无热量的甜味剂, 已被美国食品药品监督管理局 (FDA) 和日本厚生省批准列入食品添加剂。2008 年 5 月, 中华人民共和国卫生部批准 L-阿拉伯糖为新资源食品。