97.8% ±4.4%。

量, 获得满意的效果。

表4 锗的回收率 μg

样品	样品锗含量	加标准锗量	加标后锗含量	回收率 %
面粉	0.2800	0.50	0.766	97.2
大米	0.1750	0.50	0.640	93.0
小米	0.2350	0.50	0.745	102.0
玉米	0.2030	0.50	0.665	92.4
绿豆	0.2165	0.50	0.729	102.5
黄豆	0.4155	0.50	0.914	99.9
平均回收率			97.8 ±4.4	

3 参考文献

- 1 顾东蕾, 等. 有机锗抗癌药物研究进展. 国外医学, 1988; 9(1): 4
- 2 板野一臣, 等. 健康饮料水中的锗化合物的分析. 食品卫生学杂志(日文), 1992; 33: 231
- 3 川又秀一, 等. 还流式酸分解, 用和铁共同沉淀法分析食品中锗含量. 食品卫生学杂志(日文), 1987; 28: 390
- 4 Johnson D J. et al. The determination of germanium by atomic absorption spectrometry with a graphite tube atomizer. Anal Chem Acta, 1973, 67: 79
- 5 张宁, 等. 胶束增溶分光光度法快速测定有机锗制剂中锗. 全国第四届医学微量元素. 全国第一届

规范化名词

编者按 随着世界科学技术的迅速发展, 出现了大批科技名词术语。统一科技名词对科学知识的传播、国内外科技交流、学科间沟通、科技图书的编纂、出版和检索等方面都是不可缺少的。世界上经济发达国家都十分重视科技名词术语的统一。经国务院批准, 我国于 1985 年 4 月正式成立了全国自然科学名词审定委员会, 根据国务院授权, 委员会审定公布的名词术语, 科研、教学、经营及新闻出版等各部门均应遵照使用。《中国食品卫生杂志》为了贯彻国务院的方针, 促进科技术语规范化, 将结合食品卫生专业陆续刊登一系列委员会公布的科技名词。希望读者积极学习并逐渐使用推荐的规范化名词代替以往人们习惯使用的非规范化名词。

规范化名词

半合成培养基

天然培养基

富集培养基

相对标准[偏]差 *RSD*

正态分布

观测值

标准[偏]差

χ^2 检验

校正曲线

非规范化名词

半合成产毒培养基

天然产毒培养基

增菌培养基

变异系数 *CV*

高斯分布

测定值

均方根偏差

卡方检验

标准曲线

注: [ ] 中的字使用时可省略。